

DIAGNOSTYKA UKŁADOWYCH CHOROÓB TKANKI ŁĄCZNEJ

- wykrywanie przeciwciał przeciwnokórkowych (przeciwnądrowych [ANA, PPJ] i przeciwciałoplazmatycznych)
- OFERTA DIAGNOSTYKA S.A.

Sugerowane badania przesiewowe:		Metoda:	
601	ANA1	Immunofluorescencja pośrednia na HEp-2 (miano wyjściowe: 1:80)	z określeniem miana i wzoru świecenia dla wyników dodatnich
602	ANA2	Immunoblot 16 antygenów	RNP/Sm, Sm, SS-a (60), Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl 100, Jo-1, Centromer B, PCNA, dsDNA, Nukleosomy, Histony, Rybosomalne białko P, AMA-M2, DFS70
3499	ANA3	Immunoblot 44 antygeny	Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, KS, YARS (Ha), ZoA, ZoB, HMGCR, SAE-1, SAE-2, SRP54, Mi-2, TIF1y, MDA5, NXP-2, PM/Sc1 100, PM/Sc1 75, Scl-70, CENP A, CENP B, POLR3A, NOR90, Th/To, PDGFR-β, Fibrylaryna (U3-RNP), Ro-52, Ro-60, La, RNP A, RNP 68/70, RNP C, SmB, SmD, PCNA, P0, Ku, Nukleolina, Histony, Nukleosomy, dsDNA, AMA-M2, DFS70
605	ANA4	Immunofluorescencja pośrednia na HEp-2 (miano wyjściowe: 1:80) oraz immunoblot 16 antygenów	z określeniem miana i wzoru świecenia dla wyników dodatnich; oznaczane antygeny – patrz bad. 602
	Dodatkowe panele diagnostyczne	Metoda:	
3297	PPJ met. immunoblot ENA (7 antygenów)	Immunoblot 7 antygenów	nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1
619	PPJ met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)	Immunofluorescencja pośrednia na HEp-2 (miano wyjściowe: 1:80) oraz immunoblot 7 antygenów	IIF z określeniem miana i wzoru świecenia dla wyników dodatnich; oznaczane antygeny – patrz bad. 3297
3389	PPJ met. mikroblot (23 antygeny)	Immunoblot 23 antygeny	AMA-M2; CENP A; CENP B; DFS70; dsDNA; Histony; Jo-1; Ku; La; Mi-2; Nukleosomy; PCNA; PM/Sc100; PM/Sc1 75; POLR3A; RNP 68/70; RNP A; RNP C; RO-52; Ro-60; Scl-70; SmB; SmD
609	Panel Skleroderma met. immunoblot	Immunoblot 13 antygenów	PM-Sc175; PM-Sc100; Scl-70; CENP A; CENP B; RP155; RP11; NOR90; Th/To; PDGFR; Fibrylaryna; Ro-52; Ku
608	Panel Myositis met. immunoblot	Immunoblot 7 antygenów	Jo-1; PL-7; PL-12; SRP 54; Mi-2; PM/Sc1 100; Ku
3694	Panel rozszerzony Dermatomyositis met. immunoblot	Immunoblot 18 antygenów	Jo-1; PL-7; PL-12; EJ; OJ; HMGCR; SAE1; SRP; Mi-2alfa; Mi-2beta; TIF1gamma; MDA5; NXP2; PM-Sc175; PM-Sc100; Ro-52; Ku; cN-1A

Testy monoswoiste ilościowe

– ocena rokowania, monitorowanie leczenia z zastosowaniem metod ilościowych – ELISA lub CLIA:

3260	PPJ anty-dsDNA	3301	PPJ anty-Jo-1
3298	PPJ anty-SS-B (La)	3302	PPJ anty-Scl-70
3299	PPJ anty-SS-A (Ro)	3303	PPJ anty-Sm
3300	PPJ anty-centromery (ACA)	3304	PPJ anty-Sm/RNP
		3305	PPJ anty-histony

DIAGNOSTYKA CHOROÓB NACZYŃ

– wykrywanie przeciwciał przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA

ANCA - badania przesiewowe		
606	P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA)	Immunofluorescencja pośrednia z określeniem miana
4021	P/c. p. atypowym antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (aANCA)	Immunofluorescencja pośrednia z określeniem miana
ANCA - testy potwierdzenia		
635	P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG	Test monoswoisty ilościowy
636	P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG	Test monoswoisty ilościowy
637	P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA)	Met. immunoblot
3388	ANCA 6 antygenów IgG	Met. ELISA; mieloperoksydaza (MPO), proteinaza 3 (PR-3), elastaza (EL), laktoferyna (LF), katepsyna G, BPI